

Инструкция по применению Фронтлайн спрей

Frontline spray, Fipronil 0,25% (фипронил 0, 25%)

Состав

- Фипронил 2,5 мг.
- Кополивидон, изопропанол, вода очищенная 1,0 мл.
- Фармацевтическая форма: Раствор для наружного применения.

Предназначено для Собак и кошек

Показания к применению

- Для лечения и профилактики заражения паразитами, такими как блохи (*Stenoccephalides*) и клещи (*Rhipicephalus*, *Dermatocentor*, *Ixodes*), у собак.
- Для лечения и профилактики заражения паразитами, такими как блохи (*Stenoccephalides felis*) и клещи (*Rhipicephalus*, *Ixodes*), у кошек.
- Лечение и профилактика блошиных аллергических дерматитов (БАД) у кошек и собак.
- Профилактика и лечение собак и кошек от заражения пухоедами.
- Прочтите более подробно по теме «Фронтлайн спрей инструкция» на сайте, посвящённом воспитанию и уходу за собаками www.cleverdog.ru Цитирование контента без указания активной гиперссылки запрещено.

Противопоказания

- Не использовать для лечения щенков и котят в возрасте до 2-х дней.
- Не использовать для лечения животных, больных общими заболеваниями, лихорадкой и т.д., или животных на стадии выздоровления.
- Не использовать для лечения кроликов, во избежание неблагоприятных последствий, вплоть до летального исхода.

Побочные эффекты

Облизывание животными обработано поверхности вызывает кратковременное повышение слюноотделения, в основном из-за химического состава носителя.

В крайне редких случаях после применения препарата проявляются неблагоприятные реакции, такие как проходящие кожные эритемы, зуд или плешивость. В отдельных случаях после применения препарата наблюдались повышенное слюноотделение, реверсивные неврологические симптомы (гиперестезия, депрессия, повышенная нервозность), рвота и затруднение дыхания.

Специальные рекомендации по применению

Следует предпринять все необходимые меры, чтобы животные не облизывали друг друга после обработки.

Не разрешайте собаке плавать в открытых водоёмах в течение 2-х дней после обработки.

После обработки в шерсти животных могут оставаться единичные паразиты. Именно поэтому невозможно полностью исключить вероятность передачи инфекционного заболевания при неблагоприятных условиях содержания.

Использование в период беременности и лактации

Спрей **Frontline** можно применять для лечения животных в период беременности и лактации.

Дозировка и метод применения

Метод применения: наружно, распылить на поверхность шерсти.

Дозировка

Нанести от 3 до 6 мл препарата из расчёта на 1 кг веса животного (7,5 – 15 мг фипронила на кг веса), т.е. 2 – 4 нажатия на пульверизатор на кг для флаконов по 250 мл и 500 мл, или 6 – 12 нажатий на пульверизатор для флаконов по 100 мл.

Способ применения

Распылите препарат на всю шерсть животного с расстояния приблизительно 10 – 20 см. Распыляйте по направлению роста шерсти, чтобы вся шерсть пропиталась до кожного покрова. Для длинношерстных животных: расчешите шерсть, чтобы препарат проник до самой кожи на спине, боках, животе, лапах, загривке и хвосте. Для обработки морды и глаз животного нанесите спрей **Frontline spray** на руку в перчатке и мягко вотрите препарат в шерсть животного. Продолжайте до естественного высыхания, **Полотенца не использовать!**

Препарат биологически активен в течение до 5-ти недель против клещей, от 1 до 3 месяцев — против блох и до 63 дней (для собак) и 42 дней (для кошек) — против пухоедов.

Если животное содержится на улице, то минимальный интервал между обработкой — 4 недели.

Внимание!

Не распыляйте препарат в глаза животного.

Особые меры предосторожности для лиц использующих препарат для лечения животных

Настоящий препарат может вызывать раздражение слизистых оболочек и глаз. Следовательно, следует избегать прямого попадания препарата в глаза и органы дыхания.

Препарат противопоказан животным с повышенной чувствительностью к инсектицидам и спиртосодержащим жидкостям, также не рекомендуется распыление **Frontline spray** людьми с аллергией к вышеупомянутым ингредиентам.

Не допускайте попадания препарата на открытые участки кожи. Если попадания препарата избежать не удалось, то промойте участки кожи подвергшиеся контакт, тёплой

водой с мылом.

При попадании в глаза незамедлительно промойте их большим количеством чистой воды. После применения тщательно вымойте руки.

Не рекомендуется трогать шерсть животных, обработанную препаратом, до полного высыхания. Не разрешайте детям играть с животными, обработанными препаратом, до полного высыхания шерсти. В этих целях рекомендуется проводить обработку животных не днём, а вечером, не позволяйте обработанным животным спать вместе со своими хозяевами, особенно с детьми.

Не разрешается

Курить, принимать пищу во время обработки.

Срок годности

Срок годности указан на упаковке

Хранение

Хранить при температуре до 30 градусов Цельсия.

Утилизация неиспользованного продукта и пустых флаконов

Любой неиспользованный продукт и упаковка утилизируются в соответствии с правилами, установленными в данной стране.

Фипронил может негативно влиять на водные организмы.

Не загрязнять пруды, русла рек, канавы препаратом и пустыми флаконами.